



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

www.elsevier.es/rgmx



IMAGEN CLÍNICA EN GASTROENTEROLOGÍA

Metástasis cutánea (letálide) umbilical como forma de presentación inicial de adenocarcinoma de sigma

Umbilical cutaneous metastasis as initial presentation of Sigmoid adenocarcinoma

G. Renau*, J. Domènech y A. Sánchez

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona, España

Paciente de 80 años con antecedentes de ictus y cardiopatía isquémica crónica, que consulta por lesión cutánea umbilical (fig. 1) de 8 meses de evolución orientada como una onfalitis e iniciado tratamiento tópico sin respuesta clínica. Dada la persistencia, se biopsia la lesión dérmica y se evidencia al estudio anatomopatológico infiltración por adenocarcinoma de origen colorrectal.

Se realiza un estudio mediante fibrocolonoscopia, donde se encuentra una lesión a 30 cm del margen anal estenosante compatible con adenocarcinoma confirmando el origen de la metástasis cutánea. En la TC de extensión se objetivan metástasis suprarrenal, pulmonares bilaterales y peritoneales.

Consensuado en comité multidisciplinar, dada la enfermedad avanzada estadio IV sin posibilidad de tratamiento curativo, se coloca por endoscopia un stent sobre la lesión en sigma como se observa en la figura 2A y B y se administra tratamiento quimioterápico paliativo. El paciente fue éxitus a los 4 meses tras el diagnóstico definitivo.



Figura 1 Letálide umbilical. (La figura es original de los autores).

* Autor para correspondencia. Plaza Llibertat 1-3 piso 7(B. Reus; Tarragona). Código Postal 43201. Teléfono: +638525110.

Correo electrónico: guillermo.renau@salutsantjoan.cat (G. Renau).

<https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2024.09.007>

0375-0906/© 2024 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la CC BY-NC-ND licencia (<http://creativecommons.org/licencias/by-nc-nd/4.0/>).

Financiación

No se recibió patrocinio de ningún tipo para llevar a cabo este artículo.




Figura 2 Neoplasia de sigma estenosante con stent paliativo. A) TC de abdomen corte coronal evidenciando el stent colocado sobre la neoplasia en sigma. B) TC de abdomen corte axial mostrando la metástasis umbilical. (Estas figuras son originales de los autores del artículo).

Consideraciones éticas

Los autores declaran que el artículo no contiene información personal que permita la identificación de los pacientes por tratarse de imágenes limitadas de la patología a estudio. Aun así, se obtuvo el consentimiento verbal del paciente

y familiares tanto para la obtención de las imágenes como para la difusión del artículo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.