



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, sábado 16 noviembre

- 1 Chay-Correa T. D. P. y cols. Prevalencia y factores asociados a infección por *Clostridioides difficile* en niños con enfermedad inflamatoria intestinal
- 2 García-Barrón A. M. y cols. Características clínicas, bioquímicas y endoscópicas de riesgo para la respuesta al tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano
- 2 Álvarez-Valencia L. E. y cols. Aprovechamiento de residuo mediante técnica de puenteo como terapia adyuvante en niños con derivación intestinal de manera domiciliaria

■ Trabajos libres orales, domingo 17 noviembre

- 4 Reyes-Apodaca M. y cols. Afrontando la transición en fibrosis quística: análisis de la preparación de pacientes y familias
- 5 Cervantes-Garduño M. C. y cols. Factores clínicos y bioquímicos presentes en los pacientes pediátricos con estenosis esofágica por ingesta de cáusticos en un hospital de tercer nivel
- 5 Contreras-Hernández E. M. y cols. Implementación de una escala clínica diagnóstica en estenosis hipertrófica de píloro
- 5 Ramírez-Beltrán K. I. y cols. Características clínicas y manométricas en pacientes con incontinencia fecal: comparativa entre retentiva y no retentiva
- 6 Pérez-Santos P. L. y cols. Frecuencia y características de pacientes pediátricos sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- 7 Gallardo-Luna M. S. y cols. Impacto diagnóstico y terapéutico del ultrasonido endoscópico en la pancreatitis recurrente pediátrica después

de una colangiopancreatografía por resonancia magnética

- 7 Pineda-Cely E. C. y cols. Características demográficas, clínicas y genéticas de los pacientes con fibrosis quística en un hospital pediátrico durante el periodo 2018-2023
- 8 Sámano-Villanueva G. F. y cols. Hallazgos histológicos con impacto pronóstico en la respuesta al tratamiento en pacientes pediátricos con hepatitis autoinmune
- 10 Reyes-Díaz S. A. y cols. Disfunción sexual y calidad de vida en individuos con síndrome de intestino irritable: un estudio transversal
- 11 Abendaño-Rivera D. F. y cols. Asociación entre el estreñimiento crónico y el deterioro en la función cognitiva
- 12 Madrid A. M. y cols. Encuesta latinoamericana en gastroenterólogos expertos en trastornos del eje intestino-cerebro sobre el diagnóstico del síndrome de intestino irritable (SII) en su práctica clínica
- 12 García-Cedillo M. F. y cols. Efecto de la combinación de rifaximina alfa y dieta modificada en FODMAP en comparación con intervenciones individuales sobre la actividad de la lactasa en pacientes con SII sin estreñimiento y SIBO
- 13 Solís-Hernández C. G. y cols. Durmiendo con el enemigo: impacto del síndrome de intestino irritable en la calidad de vida y el sueño en pacientes mexicanos
- 14 Cruz-Saucedo A. Y. y cols. Lactulosa vs. polietilenglicol para la preparación intestinal en colonoscopia a pacientes en un hospital de tercer nivel
- 14 Toranzo-González C. J. y cols. Tasa de detección de lesiones sésiles serradas en colonoscopias de tamizaje

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Reforma 243, Piso 15

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX, México

Teléfono: (55) 5200 8770



ELSEVIER

www.elsevier.com

- 15 *Reyes-Saavedra N. y cols.* Determinación de la prevalencia de metaplasia intestinal y atrofia de la mucosa gástrica relacionada con *Helicobacter pylori* de enero de 2020 a abril de 2024 en el hospital español, un estudio retrospectivo
 - 16 *González-Arredondo A. y cols.* Un tiempo de inserción prolongado se asocia a una mayor cantidad de moco en el colon izquierdo durante una colonoscopia con intercambio de agua: resultados de una cohorte prospectiva
 - 16 *Cano-Contreras A. D. y cols.* ¿Cómo se hace el diagnóstico de infección por *H. pylori* en México? Datos del Registro Nacional Mexicano. Hp-MexReg
 - 18 *López-Bernal C. A. y cols.* Caracterización y clasificación de la función anorrectal mediante manometría anorrectal de alta resolución en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
 - 18 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Aplicación clínica del COuGH-Reflux score en pacientes referidos para estudio de enfermedad por reflujo gastroesofágico por síntomas laringoesofágicos: resultados de un estudio multicéntrico internacional
 - 19 *Alcalá-Torres V. H. y cols.* Alteraciones en la manometría esofágica posterior a infección por COVID severo, prolongado y persistente
 - 19 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Relación entre presión intragástrica y severidad de náusea y vómito crónico: un estudio manométrico
 - 20 *Vázquez-Elizondo G. y cols.* La impedancia basal nocturna es útil identificando fenotipos de ERNE en pacientes hispanicos
 - 21 *Cafaggi-Padilla D. F. y cols.* Frecuencia y factores asociados a remisión transmural en pacientes con enfermedad de Crohn en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE
 - 21 *Philippe-Ponce M. y cols.* Frecuencia y análisis de la remisión profunda en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática: un estudio retrospectivo unicéntrico
 - 22 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Impacto de los trastornos del sueño y de la conducta alimentaria en sujetos con enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable
 - 24 *Cervantes-Contreras J. I. y cols.* Frecuencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
 - 24 *Soto-Villalpando M. y cols.* Evaluación de la calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con la herramienta IBDQ-32
 - 26 *López-Sánchez M. y cols.* Incidencia de descompensación clínica en pacientes con cirrosis: asociación con el índice dietario proteína-sodio
 - 27 *Gutiérrez-Castillo A. y cols.* Incidencia de infecciones tempranas en pacientes trasplantados de hígado
 - 27 *Tadeo-Jiménez Y. y cols.* Elastografía esplénica como método no invasivo para determinar hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes con cirrosis compensada
 - 28 *Guerrero-Cabrera P. y cols.* El Doppler venoso renal y elastografía transitoria como predictores del desarrollo de síndrome cardiohepático en pacientes ambulatorios con hipertensión arterial pulmonar
 - 28 *Fajardo-Félix C. F. y cols.* Incidencia de peritonitis fúngica espontánea en paciente con cirrosis hepática en población de Ciudad de México
- Trabajos libres en cartel, domingo 17 noviembre
- 30 *Panaccione R. y cols.* Eficacia y seguridad del retratamiento con upadacitinib después de la interrupción del tratamiento en colitis ulcerosa: datos del estudio de extensión abierto de fase 3 U-ACTIVATE
 - 31 *Dubinsky M. y cols.* Risankizumab versus ustekinumab para lograr remisión clínica y la reducción de biomarcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave: resultados del estudio fase III B SEQUENCE
 - 31 *Salazar-Zamudio A. y cols.* Valor clínico del pH fecal como biomarcador de nivel de actividad en pacientes con colitis ulcerosa
 - 32 *Galindo-Félix A. y cols.* Comparación de respuesta clínica, bioquímica, endoscópica e histológica en pacientes con diagnóstico de colitis ulcerosa en tratamiento con infliximab y golimumab en un hospital de tercer nivel de Puebla
 - 33 *Molina-López M. y cols.* Evaluación de la actividad de la colitis ulcerosa en el Hospital de Especialidades Puebla: comparación de índices clínicos y reporte histopatológico
 - 34 *Philippe-Ponce M. y cols.* Análisis demográfico de pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática sometidos a proctocolectomía restaurativa con reservorio ileal: un estudio unicéntrico de los últimos 12 años
 - 35 *Martínez-Silva F. y cols.* Tofacitinib inhibidor de Jak, un nuevo mecanismo de acción en pacientes con colitis ulcerosa: serie de casos

- 35 Contreras-Avilés E. y cols. Utilidad del ancho de distribución eritrocitaria en la evaluación de la actividad de la colitis ulcerosa crónica idiopática y su correlación con biomarcadores inflamatorios
- 36 Lorenzo-Valle D. B. y cols. Relación de linfocitos/LDH como indicador de actividad en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática
- 37 Contreras-Avilés E. y cols. Impacto clínico del tratamiento con vedolizumab en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática: evidencia de un estudio del mundo real en México
- 38 Bastida-Osorio M. y cols. La albúmina sérica como marcador relacionado al curso crónico de la colitis ulcerativa crónica idiopática
- 38 Philippe-Ponce M. y cols. Cambio de diagnóstico de colitis ulcerosa crónica idiopática a enfermedad de Crohn: un estudio retrospectivo unicéntrico
- 39 Philippe-Ponce M. y cols. Eficacia de la terapia combinada con 5-ASA en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática con actividad bioquímica aislada: estudio de vida real
- 40 Mejía-Brito E. F. y cols. Manifestaciones extraintestinales asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría
- 40 Benítez-Cruz P. y cols. Prevalencia de infecciones por microorganismos oportunistas en pacientes pediátricos con tratamiento inmunosupresor para enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital General Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza, revisión de enero 2016 a diciembre 2021
- 42 Figueroa-Palafox M. y cols. Escala de Kioto modificada para *H. pylori* en población mexicana
- 43 Carmona-Castillo M. Y. y cols. Perfil endoscópico en pacientes con histología positiva vs. negativa para *Helicobacter pylori*
- 44 Domínguez-Cardoso P. F. y cols. Relación entre los hallazgos endoscópicos y score APRI en el tamizaje de varices esofágicas
- 44 González-Martínez C. E. y cols. Desenlaces y complicaciones después de la obturación de varices gástricas con cianoacrilato en pacientes con sangrado variceal
- 45 Teutli-Carrión S. y cols. Factores asociados a desarrollo de úlcera posligadura en pacientes con cirrosis
- 46 Severino-Ferreras I. E. y cols. Utilidad del ultrasonido endoscópico en la determinación de la erradicación de varices gástricas
- 46 Herrera-Elizondo J. L. y cols. Utilidad de la metoclopramida para mejorar la visualización endoscópica en sangrado de tubo digestivo alto
- 46 Pérez-Santos P. L. y cols. Ultrasonido endoscópico como herramienta diagnóstica para la localización de adenoma paratiroideo
- 47 Pérez-Santos P. L. y cols. Ultrasonido endoscópico como herramienta diagnóstica de coledocolitiasis en pacientes con riesgo intermedio de acuerdo con los criterios ASGE 2019
- 48 Ramírez-Zamudio L. C. y cols. Síndromes de Lemmel: serie de casos en un hospital de tercer nivel
- 49 García-Prado D. I. y cols. Síntomas digestivos superiores en los pacientes con bilis en cámara gástrica: ¿amigo o enemigo?
- 49 Tinitana-Jumbo C. S. y cols. Hallazgos de colonoscopias de tamizaje y relación del sexo con la histopatología
- 49 Toranzo-González C. J. y cols. Características endoscópicas de tumores neuroendocrinos del tracto gastrointestinal diagnosticados por endoscopia
- 50 Juárez-León O. y cols. Análisis de los cambios endoscópicos y etiología en los diferentes fenotipos de ectasia vascular antral gástrica
- 51 Montoya-Montoya O. J. y cols. Protocolo de Roma (Costamagna): características clínicas y endoscópicas de pacientes en un hospital de referencia
- 51 Chavarín-Meza A. E. y cols. Evaluación de la escala *Decision to scope score* (DTS) como predictora de resolución endoscópica en pacientes con ingesta de cuerpo extraño
- 52 Medina-Ávalos E. J. y cols. Endoscopia preoperatoria de rutina en pacientes sometidos a cirugía bariátrica
- 53 Flores-Pérez D. E. y cols. Frecuencia de desarrollo y prevalencia de agentes infecciosos en cultivo biliar en pacientes con colangitis aguda en el hospital español
- 53 Celis-Valenzuela G. C. y cols. La morfología de la papila de Vater influye en el tiempo y dosis de radiación durante la colangiografía retrógrada endoscópica

- 53 *Enríquez-Constantino B. A. y cols.* Correlación entre hallazgos endoscópicos e histológicos para el diagnóstico de gastritis eosinofílica
- 54 *Guzmán-Lepe A. y cols.* Hallazgos endoscópicos en ingesta de cáusticos: análisis de casos
- 54 *Fernández-Ramírez A. J. y cols.* La tasa de detección de pólipos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, experiencia en un instituto de tercer nivel en la Ciudad de México
- 55 *Rivera-Flores A. G.* Comparación de la eficacia en la preparación intestinal de una colonoscopia entre la lactulosa oral versus polietilenglicol
- 55 *Espinoza-Acuña J. R. y cols.* Puntaje de Boston en pacientes en el régimen de preparación para colonoscopia con Nulytely (macrogol) vs. Nulytely Bis (macrogol/ bisacodilo) en pacientes mayores a 50 años
- 56 *Pacheco-Serrano M. y cols.* Análisis observacional de pólipos colónicos en pacientes con acromegalia
- 57 *Rogel-Zárate L. L. y cols.* Rehabilitación intestinal: crecimiento, calidad de vida y suplementación de vitamina D en pacientes con falla intestinal portadores de nutrición parenteral domiciliaria del Hospital Infantil de México Federico Gómez
- 57 *Martínez-Subías D. y cols.* Evaluación de la prevalencia de síndrome de desgaste energético proteico en pacientes con enfermedad renal crónica con terapia de sustitución renal con hemodiálisis
- 58 *Rieppi-Díaz A. y cols.* STRONGkids: evaluación del riesgo nutricional en una sala de urgencias pediátricas
- 58 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Intervenciones nutricionales en la práctica clínica para niños con trastornos del espectro autista: perspectivas de pediatras, estudiantes de pediatría y subespecialistas
- 59 *Peña-Vélez R. y cols.* Prácticas de alimentación complementaria y desarrollo de anemia en lactantes de 12 a 24 meses de edad
- 59 *Macías-Barrera D. y cols.* Experiencia del uso de nutrición parenteral individualizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil de México Federico Gómez en pacientes quirúrgicos
- 60 *Medina-Vera I. y cols.* Evaluación del gasto energético en reposo, composición corporal y grosor del cuádriceps en población pediátrica con exceso de peso
- 60 *Ortega-Díaz K. V. y cols.* Utilidad del tamizaje nutricional al ingreso hospitalario y el impacto en el estado nutricional en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 60 *Becerra-Morales S. N. y cols.* Requerimiento energético en reposo, ángulo de fase y composición corporal entre estrato diagnóstico en pacientes pediátricos con recién diagnóstico oncológico
- 61 *Peña-Vélez R. y cols.* Punto de corte de la circunferencia media de brazo para diagnóstico de desnutrición en niños de 2 a 5 años en México
- 61 *Peña-Vélez R. y cols.* Riesgo de anemia al ingreso hospitalario en niños con diagnóstico de sobrepeso y obesidad
- 62 *Chino-Valderrábano D. y cols.* Características clínicas de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto sometidos a endoscopia en un hospital de tercer nivel
- 62 *Medina-Rodríguez S. A. y cols.* Ingesta de sustancias cáusticas en pacientes pediátricos: características clínicas, endoscópicas, tratamiento y complicaciones en un hospital de tercer nivel
- 63 *Moraga-Sánchez D. S. y cols.* Descripción del comportamiento de estenosis esofágicas, terapéutica endoscópica realizada en una unidad de endoscopia pediátrica de tercer nivel. Experiencia de 8 años
- 63 *Alvarado-Cifuentes M. D. R. y cols.* Cápsula endoscópica: un nuevo horizonte en el diagnóstico de la enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal
- 64 *Peña-Gutiérrez J. J. y cols.* Experiencia en el uso de cápsula endoscópica en pacientes pediátricos de un hospital de tercer nivel
- 64 *Guerrero-Valenzuela A. F. y cols.* Caracterización y evolución clínica de la motilidad esofágica inefectiva en pacientes pediátricos: estudio retrospectivo en un centro de referencia
- 65 *Elizondo-Benet S. y cols.* Manometría esofágica de alta resolución en los pacientes pediátricos con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario
- 65 *Castro-Zárate A. L. y cols.* Utilidad de IMBN y PSPW en el espectro diagnóstico de reflujo gastroesofágico en una población pediátrica
- 66 *Quesada-Tortoriello A. I. y cols.* Presentación atípica (síntomas respiratorios): asociada con reflujo gastroesofágico no ácido en la población pediátrica: resultados preliminares

- 66 Rico-Rojas D. y cols. Abordaje de alergia alimentaria para el control de síntomas en pacientes con esofagitis eosinofílica. Serie de casos
- 67 Arellano-Sánchez D. R. y cols. Prevalencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia
- 67 Escobedo-Berumen L. y cols. Factores sociodemográficos asociados a gastroenteritis viral aguda en pediatría postpandemia en México
- 68 Obando-Lazo F. J. y cols. Alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV), conocimientos del personal médico sobre diagnóstico y el tratamiento
- 68 Pardo-Gutiérrez A. L. y cols. Modificación de la microbiota intestinal y reducción de sintomatología posterior a un mes de tratamiento estándar en lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca
- 68 Flores-Castillo J. L. y cols. Descripción demográfica, clínica, diagnóstica y terapéutica de pacientes pediátricos con adenocarcinoma colorrectal
- 70 Velasco-Benítez C. A. y cols. Ausentismo escolar y social en niños entre 8 y 18 años de edad con trastornos del eje cerebro-intestino
- 70 Velasco-Suárez D. A. y cols. Ansiedad, depresión y calidad de vida en escolares colombianos con estreñimiento funcional de un colegio público rural
- 70 Moreno-Rivas A. P. y cols. Cambios en el patrón evacuatorio durante la hospitalización en pacientes pediátricos
- 70 Hernández-López A. J. y cols. Enfermedades psiquiátricas en pacientes pediátricos con dispepsia funcional en el Instituto Nacional de Pediatría del 2015-2022
- 71 Velasco-Suárez D. A. y cols. Disfagia funcional en niños entre 10 y 18 años de edad
- 71 Guillén-Guerrero M. C. y cols. La mente sobre el esófago: comorbilidades psiquiátricas en trastornos funcionales esofágicos
- 72 Leal-Cortés S. A. y cols. Malacoplaquia intestinal, reporte de 2 casos
- 72 Velasco-Suárez D. A. y cols. Diarrea funcional en niños entre los 8 y 18 años de edad
- 73 Velasco-Suárez D. A. y cols. Proctalgia fugaz en niños entre 10 y 18 años de edad
- 73 Velasco-Suárez D. A. y cols. Trastornos del eje cerebro-intestino en pretérminos de un programa canguro
- 73 Veloz-Corona Q. y cols. Explorando la conexión entre disquecia infantil y estreñimiento funcional
- 74 Tribouillier-Espinoza E. L. y cols. Asociación de niveles de vitamina D con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes pediátricos
- 74 Álvarez-Cruz D. E. y cols. Prevalencia de la enfermedad fibroestenótica en pacientes pediátricos con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital de tercer nivel
- 75 Rojo-Rosales A. y cols. Características clínicas de pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal que recibieron terapia biológica en un hospital de tercer nivel
- 75 Amaro-Reynoso C. U. y cols. Manifestaciones extraintestinales y gravedad de la enfermedad en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 76 Maldonado-Rivera C. y cols. Enfermedad de Crohn; uso de ustekinumab (UST) vs. anti-TNF en Hospital Central Sur de Alta Especialidad, Petróleos Mexicanos
- 76 Rivera-Suazo Y. y cols. Factores de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda recurrente y pancreatitis crónica en niños – experiencia de un centro de tercer nivel
- 77 Enríquez-Mireles M. y cols. Diagnóstico y seguimiento de niños con pancreatitis hereditaria en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB)
- 78 Maldonado-Rivera C. y cols. Pancreatitis crónica recidivante idiopática en pacientes pediátricos, serie de casos en el HCSAE PEMEX
- 78 Alfaro-Bolaños J. E. y cols. Pancreatitis aguda recurrente y crónica: relación entre el número de episodios y los resultados a largo plazo en un hospital terciario
- 78 González-Heredia C. A. y cols. Características clínicas de los pacientes con pancreatitis aguda en hospital de tercer nivel. Experiencia de 10 años
- 79 Maldonado-Rivera C. y cols. Síndrome de Alagille: reporte de casos del HCSAE
- 79 Reyes-Apodaca M. y cols. Encuesta sobre los desafíos y éxitos en la atención de la fibrosis quística en América Latina
- 80 Carrillo-Gutiérrez A. A. y cols. Manifestaciones clínicas en enteropatía congénita asociada a NEUROG3: una serie de casos

- 81 *Flores-Castillo J. L. y cols.* Descripción demográfica, clínica y genética de pacientes pediátricos con síndromes de poliposis intestinal en un Hospital Pediátrico de México
 - 81 *Zubieta-Burgos M. A. y cols.* Síndrome de artrogriposis-disfunción renal-colestasis (ARC). Presentación de dos casos con variante patogénica en el gen *VPS33B*, *C.1498G > T*, *P. GLU500**
 - 81 *Carrillo-Gutiérrez A. A. y cols.* Manifestaciones clínicas del síndrome de Alagille en pacientes pediátricos en un Instituto Nacional de Salud
 - 83 *Flores-Castillo J. L. y cols.* Linfangiectasia intestinal primaria: descripción clínica, nutricional, endoscópica e histológica. Serie de casos
 - 83 *García-Barrón A. M. y cols.* Síndrome de Alagille: presentación clínica y diagnóstico de pacientes de una institución de tercer nivel de pediatría en la Ciudad de México del año 2003 a 2023
 - 85 *Obando-Lazo F. J. y cols.* Medición de escala CIOMS/RUCAM para hepatotoxicidad en pacientes oncológicos pediátricos
 - 85 *Franco-Gutiérrez D. L. y cols.* Características clínicas de los pacientes con daño hepático asociado a insuficiencia intestinal
 - 86 *Chelius-Muñoz M. F. y cols.* Calidad de vida de los niños receptores de trasplante hepático y sus cuidadores
 - 86 *Hernández-Gómez G. D. y cols.* Biomarcadores inflamatorios en la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica (MAFLD) en pacientes pediátricos
 - 87 *Lizardi-Benítez G. E. y cols.* Precisión de las escalas PELD/MELD y pCLIF SOFA para predecir mortalidad en niños con falla hepática aguda, aguda sobre crónica o crónica
 - 88 *Amaro-Reynoso C. U. y cols.* Hemorragia variceal secundaria a hipertensión porta en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez
 - 88 *Villagómez-López I. y cols.* MASLD en pacientes pediátricos con obesidad: interacción clínica y balance REDOX
 - 89 *Romano-Velazco J. A. y cols.* Relación entre la cateterización umbilical y absceso hepático neonatal: un reporte de seis casos
 - 89 *Chávez-Marcocchio A. y cols.* Correlación de índice de masa corporal y resistencia a la insulina en pacientes pediátricos con diagnóstico de esteatosis hepática en el Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca
 - 90 *Sánchez-Martínez A. M. y cols.* Experiencia en el diagnóstico y tratamiento de quiste de colédoco en un hospital de tercer nivel en México en los últimos 10 años
 - 90 *Paredes-Alcocer A. D. y cols.* Quiste gigante de colédoco, una causa inusual de dolor abdominal en pediatría: serie de casos
 - 91 *Amezcu-Martínez J. y cols.* Epidemiología, características clínicas, histológicas y tratamiento quirúrgico de pacientes pediátricos con diagnóstico de quiste de colédoco en los últimos 10 años diagnosticados en un hospital de tercer nivel
 - 92 *Guzmán-Avilán K. D. y cols.* Colecistolitiasis en pacientes pediátricos. Datos clínicos y complicaciones
- Trabajos libres orales, lunes 18 noviembre
- 93 *Vargas-Basurto J. L. y cols.* Experiencias adversas de la infancia y cambios manométricos en individuos con incontinencia fecal y estreñimiento funcional
 - 94 *Schmulson M. y cols.* Evaluación de diarrea crónica con enfoque en diarrea funcional, modificadores clínicos y biomarcadores
 - 94 *Hanna-Jairala I. y cols.* Encuesta latinoamericana en gastroenterólogos expertos en trastornos del eje intestino-cerebro (TIIC) sobre el tratamiento del síndrome de intestino irritable (SII) en la práctica clínica
 - 96 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Frecuencia de ansiedad y depresión en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable en una población mexicana
 - 97 *Vargas-Basurto J. L. y cols.* ¿Glucosa o lactulosa?Cuál es mejor. Variabilidad y reproducibilidad de las pruebas de aliento en sujetos sanos
 - 98 *Celis-Valenzuela G. C. y cols.* Radiación durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) a considerar como indicador de calidad en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González
 - 99 *Cardona-Torres J. L. y cols.* Hallazgos endoscópicos y desenlaces clínicos en pacientes con HTDA y ERC terminal
 - 100 *Pérez-Ortiz A. y cols.* Miotomía de Heller laparoscópica con “pull-down” como alternativa de tratamiento en acalasia con megaesófago

- 100 Báez-Serrano A. R. y cols. Factores asociados a la presentación de dispepsia orgánica en una población con dispepsia al noroeste de México
- 100 Esquivel-Steffanoni M. R. y cols. Utilidad en cirugía de la escala "Colon leakage score" en riesgo de fuga de anastomosis al recto
- 101 Thomas-Dupont P. y cols. Evolución de la seroprevalencia de la enfermedad celiaca en donantes de sangre en el sur de México: un estudio comparativo de 10 años
- 102 Martínez-Castillo M. y cols. Pacientes con hepatitis alcohólica muestran mejora en la lipoperoxidación con tratamiento prednisona más ácido graso omega-5
- 103 Abendaño-Rivera D. F. y cols. Prevalencia y principales características de trombosis del sistema venoso portal en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada descompensada
- 103 Munguía-Guizar M. Y. y cols. Análisis de los factores asociados a mala respuesta bioquímica al ácido ursodesoxicólico (UDCA) en pacientes con colangitis biliar primaria (CBP) en una cohorte mexicana
- 104 Sánchez-Sánchez C. Y. y cols. Correlación entre el factor de crecimiento de tejido conectivo y el grado de fibrosis en pacientes con colangitis biliar primaria (CBP)
- 104 Sánchez-Sánchez C. Y. y cols. Lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL) para fenotipificar lesión renal aguda en pacientes cirróticos con hepatitis por alcohol grave
- 106 Medina-Ávalos E. J. y cols. Relación de hallazgos histológicos de esófago de Barrett y patrones de mucosa descritos por endoscopia
- 106 Soriano-Márquez J. P. y cols. Prevalencia de prueba inmunoquímica fecal positiva y factores asociados en población mexicana con riesgo promedio de cáncer colorrectal
- 107 García-Aguilar A. D. y cols. Perfil epidemiológico y análisis de supervivencia del carcinoma hepatocelular tratado con embolización transarterial en el Instituto Nacional de Cancerología
- 107 Teutli-Carrión S. y cols. Concordancia interobservador de patrones superficiales endoscópicos en pacientes con esófago de Barrett
- 108 Cruz-Ramírez Y. J. y cols. Mutaciones del gen KRAS, en cáncer colorrectal en población mexicana
- 109 Francisco M. D. R. y cols. Evaluación de biomarcadores inmunometabólicos en sujetos con MASLD suplementados con ácido alfaipoico-*Silybum marianum* (Ludlev®) y dieta mediterránea
- 110 Ramírez-Mejía M. M. y cols. Riesgo cardiovascular elevado en mujeres mexicanas con hígado graso asociado a disfunción metabólica
- 110 Borbolla-Schega I. y cols. Patrones de composición corporal determinados por bioimpedancia eléctrica como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad hepática esteatósica, esteatohepatitis y fibrosis hepática
- 111 Castillo-Martínez M. F. y cols. Utilidad diagnóstica de fibrosis hepática de un nuevo método no invasivo (HEPAMET) en paciente con enfermedad por hígado graso no alcohólico
- 112 Velarde-Chávez J. A. y cols. Aplicación clínica del puntaje de fibrosis NAFLD y del puntaje de fibrosis HEPAMET en enfermedad arterial coronaria y MASLD: un estudio transversal en población del oeste de México
- 113 Cano-Contreras A. D. y cols. Efecto de la suplementación con ácido alfaipoico y *Silybum Marianum* (Ludlev®) en asociación con dieta mediterránea para la mejoría del hígado graso asociado a disfunción metabólica
- 113 Cano-Contreras A. D. y cols. Perfil de hepatocinas y citocinas proinflamatorias en pacientes con aterosclerosis carotídea y esteatosis hepática metabólica
- 114 Fierro-Angulo O. M. y cols. Prevalencia y factores de riesgo asociados con la presencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2 en una población de alto riesgo
- 114 Román-Calleja B. M. y cols. El ejercicio físico monitorizado mejora la función cognitiva y la hemodinámica cerebral en pacientes con esteatosis hepática metabólica: un ensayo clínico aleatorizado, controlado y abierto
- 115 García-Alonso D. A. y cols. Impacto del consumo de alcohol en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 115 Murillo-López M. y cols. Prevalencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y uso de terapia biológica
- 116 Bastida-Guadarrama K. M. y cols. Alteraciones hepáticas encontradas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital de tercer nivel

- 117 Pérez-Roa G. F. y cols. Prevalencia de enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica, fibrosis avanzada y cirrosis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 118 Parra-Holguín N. N. y cols. Mantenimiento de la remisión clínica con biocomparable adalimumab (ABP 501) a seis meses de tratamiento y frecuencia de eventos adversos
- 118 García-Alonso D. A. y cols. Terapia avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal y su impacto en la calidad de vida
- 118 Guinea-Lagunes A. y cols. Prevalencia de quantiFERON positivo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal elegibles para terapia biológica: análisis clínico y demográfico
- 119 Hernández-Rodríguez R. T. y cols. Epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal en un Centro de Alta Especialidad en México: estudio retrospectivo en un periodo de 10 años
- 120 Narváez-Chávez S. M. y cols. Enfermedad inflamatoria intestinal como causa de depresión: importancia en el manejo multidisciplinario
- 120 Contreras-Avilés E. y cols. Características clínicas y demográficas de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital de tercer nivel en México
- 121 Contreras-Avilés E. y cols. Retraso en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, impacto clínico y socioeconómico
- 121 Murillo-López M. y cols. Prevalencia de cáncer en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: cohorte retrospectiva de 10 años en el CMN "20 de Noviembre"
- 122 Almeida-Del Prado S. G. y cols. Diagnóstico de cáncer colorrectal en pacientes con colitis ulcerosa crónica inespecífica: estudio observacional en un hospital de tercer nivel en México
- 123 Sánchez-Sánchez C. Y. y cols. Características clínicas en una serie de casos de colitis ulcerosa crónica idiopática e infección por VIH en un hospital de tercer nivel
- 124 Tinitana-Jumbo C. S. y cols. Impacto en la calidad de vida de los pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 125 Guirao-Pérez R. y cols. Erradicación de *Helicobacter pylori* con esquema cuádruple con bismuto basado en doxiciclina en un hospital de tercer nivel
- 125 Remes-Troche J. M. y cols. Eficacia de la terapia cuádruple con bismuto basada en tegoprazan comparada con la terapia cuádruple con bismuto para la erradicación de *Helicobacter pylori*: experiencia en el mundo real
- 126 Martínez-Pérez G. P. y cols. Esquemas de erradicación para la infección de *H. pylori* y su eficacia. Análisis del Registro Nacional Mexicano (HP-MEX-REG)
- 126 Ramírez-Marcial R. y cols. Lesiones endoscópicas e histológicas asociadas a infección por *Helicobacter pylori*, en población mexicana del Hospital Juárez de México, durante el año 2023
- 127 Gutiérrez-Bailón V. Y. y cols. Deficiencia de hierro, vitamina B₁₂ y ácido fólico en adultos con infección activa por *Helicobacter pylori*
- 127 Goudet-Vértiz E. y cols. Causas asociadas, factores protectores para mortalidad en sangrado de tubo digestivo alto y rendimiento de las escalas Blatchford, Rockall y AIMS-65
- 128 Durán-Castro J. J. y cols. Hallazgos de *Sarcina ventriculi* en patología gástrica: una bacteria más común de lo que se cree. Serie de casos
- 128 Tórrez-Arias L. A. y cols. Características clínico-patológicas de pacientes con adenocarcinoma gástrico en un centro de tercer nivel
- 129 Toledo-Galván R. y cols. Hallazgos endoscópicos e histológicos en pacientes con dispepsia no investigada que acuden a un hospital de tercer nivel
- 130 Mejía-Ramírez J. y cols. Principales manifestaciones gastrointestinales en pacientes con enfermedades reumatológicas
- 131 Espinoza-López D. E. y cols. Cambios histológicos en pacientes con diarrea crónica y colonoscopia normal que acuden a un hospital de tercer nivel
- 131 Solís-Hernández C. G. y cols. Frecuencia y comportamiento epidemiológico de diarrea crónica en una población mexicana
- 132 Jiménez-Urrutia K. A. y cols. Prevalencia de infecciones gastrointestinales causantes de diarrea aguda

■ Trabajos libres en cartel, lunes 18 noviembre

- 124 Oviedo-Garza C. A. y cols. Interacción entre la infección por *Helicobacter pylori* y el síndrome metabólico como factor de riesgo para el desarrollo de lesiones gástricas premalignas en la población mexicana

- 133 *Lugo-García D. y cols.* Características epidemiológicas de endoscopia e histología en el abordaje del paciente con diarrea crónica en Hospital de Especialidades IMSS Puebla
- 134 *Rivas-Salas S. A. y cols.* Colitis nucleomigrans: ¿un nuevo tipo de colitis microscópica? Serie de casos y revisión de literatura
- 134 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Remisión profunda en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática tratados con terapia biológica versus terapia convencional
- 135 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Correlación entre la calprotectina fecal y un nuevo índice integral para evaluar la actividad de la enfermedad en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática (CUCI)
- 135 *Castellanos-Hernández T. y cols.* Características histopatológicas de la colitis eosinofílica en población veracruzana
- 135 *Sánchez-Rosado R. R. y cols.* Utilidad del índice ALBI como indicador pronóstico en pacientes con cáncer de recto
- 136 *Aguirre-García J. y cols.* Tamizaje de cáncer colorrectal en la población con trasplante hepático. Un estudio de cohorte
- 137 *Almeida-Del Prado S. G. y cols.* Características demográficas y clínicas del cáncer anal en un hospital de tercer nivel en México durante la última década
- 138 *Almeida-Del Prado S. G. y cols.* Evaluación clínica y epidemiológica del cáncer colorrectal: análisis de 35 años en un hospital de tercer nivel en México
- 138 *Campos-Martínez B. I. y cols.* Epidemiología del cáncer colorrectal en adultos menores de 50 años en el hospital español de México
- 139 *Guinea-Lagunes A. y cols.* Evaluación de la práctica de cirugía ambulatoria en el servicio de coloproctología de un hospital de tercer nivel en México
- 140 *Cupil-Escobedo L. V. y cols.* Prevalencia de pólipos en pacientes con colonoscopia de seguimiento posterior a resección de cáncer colorrectal
- 140 *Santoyo-Fexas L. y cols.* Cáncer colorrectal en adultos jóvenes: características clínico-demográficas en una población del noreste de México
- 141 *García-Rentería J. E. y cols.* Terapia de biorretroalimentación (TBRA) del hospital español, consenso de egresados, experiencia de 25 años
- 141 *González-Torres L. A. y cols.* Síndrome de la arteria mesentérica superior: una serie de casos del síndrome de Wilkie
- 142 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Fenotipo clínico del estreñimiento en pacientes con hipotiroidismo primario bajo tratamiento: un estudio de corte transversal en la población del occidente de México
- 143 *Ortiz-Martínez J. R. y cols.* Utilidad diagnóstica de los hallazgos obtenidos por videocápsula endoscópica en patologías de intestino medio
- 143 *Rangel-Zavala G. y cols.* Tumores colorrectales de estirpe histológica atípica en pacientes atendidos en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 144 *Esquivel-Steffanoni M. R. y cols.* Experiencia de anastomosis primaria o secundaria al recto en un hospital de tercer nivel
- 144 *López-Contreras R. y cols.* Cápsula endoscópica como auxiliar diagnóstico de isquemia mesentérica aguda: serie de casos
- 145 *Ordóñez-Vázquez A. L. y cols.* Características epidemiológicas en pacientes con incontinencia fecal: experiencia en un hospital de tercer nivel de atención
- 146 *Guzmán-Pérez V. y cols.* Hallazgos morfológicos y funcionales del piso pélvico en pacientes con trastornos de la defecación evaluados mediante defecografía por resonancia magnética (DRM)
- 146 *Robles-Casanova L. y cols.* Descripción multidimensional de pólipos colorrectales: características epidemiológicas, endoscópicas e histológicas en un hospital de tercer nivel en México
- 147 *Cruz-Ramírez Y. J. y cols.* Sangrado digestivo como manifestación de leiomiomas
- 147 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Una década de tumores raros: frecuencia y comportamiento epidemiológico de los tumores neuroendocrinos digestivos en un hospital de tercer nivel
- 149 *Baños-Vázquez R. y cols.* Vitamina D y su relación en el perfil lipídico y composición corporal en mujeres con síndrome de intestino irritable
- 150 *Pérez-Trabanca D. M. y cols.* Desempeño del cribado nutricional combinado con criterios GLIM en el diagnóstico de desnutrición en pacientes con pancreatitis. Reporte preliminar
- 151 *Carranza-Carrasco A. y cols.* Evaluación de la alimentación en pacientes con cirrosis hepática. ¿Es diferente en los que desarrollan encefalopatía hepática abierta?

- 152 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Utilidad de la escala mSPAP-1 para valorar la gravedad de pancreatitis aguda en un hospital de tercer nivel
- 153 *Venegas-Gómez V. A. y cols.* Prevalencia y características clínicas de pacientes con pancreatitis aguda que desarrollan trombosis venosa esplácnica
- 153 *Gómez-Mendoza R. A. y cols.* Factores asociados a la presencia de esteatosis pancreática no alcohólica en pacientes con síndromes coronarios agudos
- 153 *Reyna-Aréchiga A. I. y cols.* Litotripsia guiada por pancreatoscopia preoral con SpyGlass en pacientes con pancreatitis crónica calcificada asociada a dolor abdominal. Serie de casos
- 154 *Valencia-Chávez J. y cols.* Factores de riesgo para el desarrollo de pancreatitis crónica posterior a un evento de pancreatitis aguda
- 154 *Cuevas-Maldonado M. S. y cols.* Relación entre el índice de neutrófilos-linfocitos con el grado de severidad según escala de Marshall modificada en pacientes con pancreatitis aguda severa
- 155 *Vargas-Olmos I. O. y cols.* Desenlaces clínicos y bioquímicos de la reanimación hídrica agresiva vs. reanimación hídrica conservadora en pacientes con pancreatitis aguda
- 155 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Índice neutrófilo-creatinina como predictor de severidad en pancreatitis aguda
- 156 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Índice de proteína C reactiva (PCR)/albúmina sérica como predictor de mortalidad al ingreso en hospitalización por pancreatitis aguda
- 156 *Zubía-Nevárez C. I. y cols.* Desenlaces a largo plazo de pacientes con enfermedad relacionada a IgG4 de fenotipo pancreatobiliar en una cohorte mexicana de un centro de tercer nivel
- 157 *Arce-Hernández J. A. y cols.* Tumores neuroendocrinos de la vía biliar: serie de casos de un Centro en Monterrey, Nuevo León
- 158 *Ochoa-Maya J. P. y cols.* Factores de riesgo para esteatosis pancreática en población mexicana
- 158 *Tornel-Avelar A. I. y cols.* El impacto de la pandemia en el diagnóstico y la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas. No todo fue negativo
- 160 *Cupil-Escobedo L. V. y cols.* Comparación de escalas MELD en pacientes con enfermedad hepática crónica descompensados con hemorragia variceal como predictor de mortalidad en un centro de tercer nivel de atención
- 161 *Méndivil-Sáenz S. P. y cols.* Nivel plasmático del factor de von Willebrand como predictor de mortalidad en pacientes con hepatopatía crónica
- 161 *Gallardo-González L. I. y cols.* Experiencia con dexmedetomidina en el manejo de síndrome de supresión etílica en pacientes con cirrosis
- 162 *Rangel-Zavala G. y cols.* Patrones de resistencia y susceptibilidad antimicrobiana en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 162 *Pérez-López K. P. y cols.* Efecto de los betabloqueadores en la supervivencia y frecuencia de complicaciones en pacientes con cirrosis hepática descompensada por ascitis
- 163 *Granados-Espinosa D. L. y cols.* Frecuencia de sarcopenia en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica y asociación con mortalidad
- 163 *Rivera-Huizar M. y cols.* Prevalencia de polifarmacia e interacciones farmacológicas en pacientes con cirrosis hepática del HES CMN La Raza
- 164 *Bautista-Mondragón C. A. y cols.* Predictores de mortalidad y necesidad de trasplante hepático en pacientes con hepatitis viral A
- 165 *Hernández-Rodríguez R. T. y cols.* Profilaxis secundaria de hemorragia variceal con atorvastatina en pacientes con cirrosis hepática compensada e hipertensión portal clínicamente significativa
- 166 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Índice neutrófilo/linfocito (INL) como predictor para identificar la presencia de infecciones bacterianas en pacientes con cirrosis descompensada en hospitalización
- 166 *Rangel-Espinosa V. y cols.* Asociación entre la desnutrición medida por fuerza de agarre y la presencia de encefalopatía hepática mínima en mujeres con cirrosis hepática
- 167 *Díaz de la Vega-Broissin D. y cols.* Evaluación del "tiempo-puerta-paracentesis" en un grupo de pacientes con ACLF
- 167 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Validación de los índices neutrófilo/linfocito (INL), linfocito/monocito (ILM) y plaqueta/linfocito (IPL) para predecir mortalidad a corto plazo en pacientes con cirrosis descompensada
- 168 *Rodríguez-García M. E. y cols.* Tiempo de inicio de antibiótico en pacientes hospitalizados con ACLF y su asociación con mortalidad

- 169 *Abendaño-Rivera D. F. y cols.* Factores de riesgo para mortalidad en pacientes con cirrosis descompensada durante su hospitalización
- 169 *Govea-Mendoza B. y cols.* Antecedentes asociados e incidencia de falla hepática aguda secundaria a infección por virus de hepatitis A en el ISSSTE Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos
- 170 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Desarrollo de enfermedades metabólicas en pacientes postrasplantados: estudio de cohorte en el CMN 20 de Noviembre, ISSSTE
- 170 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Prueba colorimétrica para diagnóstico temprano de peritonitis bacteriana espontánea
- 171 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Mortalidad y desenlace de la lesión renal aguda en pacientes hospitalizados con cirrosis, lesión renal e infección bacteriana
- 171 *Pérez-Reséndiz K. E. y cols.* Factores de riesgo para desarrollo de sarcopenia en pacientes cirróticos en evaluación para trasplante hepático
- 172 *Robles-Casanova L. y cols.* Utilidad del ultrasonido Doppler para predecir hemorragia variceal en pacientes con cirrosis hepática: correlación con MELD 3.0
- 172 *Antuna-Villaseñor L. R. y cols.* Efectos adversos del uso de terlipresina en infusión comparado con bolos en pacientes con cirrosis hepática y hemorragia variceal. Estudio TERMEX
- 173 *De la Vega-Mireles R. y cols.* Factores predictores de requerimiento transfusional en hemorragia digestiva alta variceal en pacientes con cirrosis hepática
- 174 *Espinoza-Acuña J. R. y cols.* Modelo MELD 3.0 como predictor de descompensación aguda grave e ingreso hospitalario en pacientes con enfermedad hepática avanzada
- 174 *Hidalgo-Muñoz S. y cols.* Uso de octreotide en hemorragia variceal: riesgo de resangrado según la reserva funcional hepática
- 175 *Aguilar-De la O J. C. y cols.* Tuberculosis latente en pacientes candidatos a trasplante hepático ortotópico: experiencia de un centro de tercer nivel
- 176 *Romero-Gómez K. y cols.* Meld-lactato como predictor de severidad en pacientes con sangrado agudo variceal esofágico
- 176 *Vera-Nungaray S. A. y cols.* Complicaciones presentadas en pacientes postrasplante hepático en un hospital de tercer nivel en México

- 178 *Pena-Montes A.* Frecuencia y características clínicas de dispepsia en pacientes con cirrosis hepática

■ Trabajos libres orales, martes 19 noviembre

- 179 *Moreno-Fuentes M. y cols.* Desarrollo del síndrome metabólico posterior a la miotomía de Heller en pacientes con acalasia
- 179 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Perfiles fisiológicos y psicológicos en la disfagia funcional: un enfoque multidimensional
- 180 *Torres-Villalobos G. y cols.* Hallazgos histológicos en el músculo del esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia
- 181 *García-Rentería J. E. y cols.* Nuevo índice para liberar el potencial de la integral contráctil de la UEG y permitir su uso en extenso
- 181 *Arenas-Martínez J. S. y cols.* Evaluación del aclaramiento de bolo: análisis mediante un índice de impedancia por manometría de alta resolución en pacientes con disfagia esofágica
- 182 *Mendoza-Martínez V. M. y cols.* Efecto del tratamiento nutrición y la rehabilitación deglutoria sobre el estado nutricional de pacientes con disfagia orofaríngea. Ensayo clínico
- 183 *Martínez-Castillo M. y cols.* Evaluación de IL-6, IL-10, TNF- α y CXCL8/IL-8 de acuerdo con el grado de fibrosis hepática por hepatitis C crónica
- 183 *Andrade-González D. L. y cols.* Éxito de un segundo tratamiento con antivirales de acción directa en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C
- 184 *Castillo-Barradas M. y cols.* Utilidad del FIB-4 Plus como predictor no invasivo de varices esofágicas en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada por virus de hepatitis C
- 184 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Características bioquímicas relacionadas con el desarrollo de enfermedad ósea en enfermedades hepáticas autoinmunes en un hospital de tercer nivel
- 185 *Coronel-Castillo C. E. y cols.* Niveles de IL-10 e IFN- γ medidos por espectrometría como predictores de mortalidad y desarrollo de ACLF en pacientes con cirrosis descompensada
- 187 *García-Zermeño K. R. y cols.* Eficacia de la estimulación del nervio tibial en el tratamiento de incontinencia fecal y estreñimiento crónico asociados a hiposensibilidad rectal: resultados de un estudio piloto

- 187 *Keil-Ríos D. y cols.* Prevalencia estacional de ciclosporiasis en pacientes con enfermedad diarreica estudiada con panel gastrointestinal en la ciudad de México: una encuesta transversal
- 188 *López-Nepomuceno A. y cols.* Validez y fiabilidad de los criterios GLIM como score diagnóstico de desnutrición en pacientes ambulatorios con cirrosis hepática
- 189 *López-Urbina G. y cols.* Respuesta terapéutica a neuromodulación y biofeedback en pacientes con hipersensibilidad anorrectal y colitis ulcerativa en la población del Hospital de Especialidades de Puebla, Centro Médico Nacional General de División Manuel Ávila Camacho, Puebla, México
- 189 *Martínez-Pérez G. P. y cols.* Evaluación de indicaciones clínicas para la erradicación de *Helicobacter pylori* en México: un estudio basado en el registro nacional Hp-MexReg
- 191 *Méndez-Hernández D. P. y cols.* Incidencia de comorbilidades autoinmunes, inflamatorias, neurológicas y crónico-degenerativas en una cohorte de pacientes con acalasia
- 192 *Vieyra-Vega M. y cols.* Validación en español de la versión corta de la escala de hipervigilancia esofágica y ansiedad específica "EHAS-7" en población mexicana
- 193 *Guinea-Lagunes A. y cols.* Evaluación de la función sexual en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 193 *Domínguez-Barradas R. N. y cols.* Resultados de una campaña de pruebas PIF para la detección de cáncer colorrectal
- 195 *Martínez-Cuazitl A. y cols.* Biomarcadores en saliva mediante espectroscopia EITF y un sensor de láser de cascada cuántica de hemorragia variceal
- 196 *Rosales-Sotomayor G. y cols.* Composición corporal por tomografía computarizada para el diagnóstico y evaluación de sarcopenia y osteoporosis en pacientes con pancreatitis crónica
- 197 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Coexistencia de pancreatitis crónica y cirrosis: enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol
- 197 *Pereira-García A. y cols.* Impacto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica transitorio vs. persistente en los desenlaces de la pancreatitis aguda
- 198 *Iglesias-García J. y cols.* Detección de imágenes de flujo (DFI) guiado por ultrasonido endoscópico: una nueva técnica de imagen avanzada para

el diagnóstico diferencial de tumores sólidos de páncreas

- 199 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Desenlaces clínicos en pacientes con pancreatitis crónica en un centro de tercer nivel

■ Trabajos libres en cartel, martes 19 noviembre

- 200 *Flores-Sánchez A. y cols.* ¿El estrés oxidativo es un biomarcador en el patrón de consumo y la enfermedad hepática alcohólica?
- 201 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* Comparación de modelo ALBI (índice albúmina/bilirrubina) con escalas conocidas como predictor de respuesta al tratamiento con esteroides en pacientes con hepatitis alcohólica severa
- 201 *Medina-Ávila K. Z. y cols.* La inmunidad celular periférica es modificada por el consumo riesgoso y excesivo de alcohol
- 201 *Dorantes-Álvarez J. A. y cols.* Susceptibilidad a la progresión del daño hepático inducido por tioacetamida en el modelo murino de acuerdo con el sexo. Implicaciones en la búsqueda de terapias farmacológicas
- 202 *Munguía-Lares C. A. y cols.* Efectos secundarios con el uso de inhibidores de tirosin-quinasa en una cohorte de pacientes con carcinoma hepatocelular
- 202 *Loza-Hernández B. N. y cols.* Impacto de la hiperlactatemia en la respuesta al tratamiento esteroide en pacientes con hepatitis alcohólica grave
- 203 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Factores relacionados a mayor mortalidad en pacientes con hepatitis grave asociada al alcohol tratados con prednisona en dos centros de tercer nivel
- 204 *Rodríguez-Jacobo S. y cols.* Valor de MELD-lactato como predictor de mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto variceal
- 205 *Pérez-López K. P. y cols.* Sobrevida en pacientes con cirrosis hepática descompensada por ascitis a los que se le realiza paracentesis de gran volumen
- 205 *Román-Lugo G. A. y cols.* Mortalidad en pacientes cirróticos con hemorragia variceal
- 206 *Pérez-Sánchez J. y cols.* Factores de riesgo asociados con resangrado temprano en pacientes con cirrosis hepática y hemorragia variceal
- 207 *Durán-Castro J. J. y cols.* Factores de riesgo y progresión a enfermedad renal crónica en pacientes

- cirróticos ingresados con lesión renal aguda en el Hospital de Especialidades Puebla
- 208 *Soto-Agustín P. J. y cols.* Niveles de alfa fetoproteína según la etiología de cirrosis hepática, en pacientes con carcinoma hepatocelular: análisis de casos
 - 208 *Jiménez-Mendoza J. C.* Desenlaces y características en pacientes con síndrome hepatopulmonar en un centro de tercer nivel en la ciudad de México: un análisis descriptivo
 - 209 *Flores-Peña R. y cols.* La naringenina, un flavonoide eficaz para prevenir el desarrollo de la fibrosis hepática experimental al inhibir la vía α -SMA/TGF- β
 - 210 *Hernández-Barragán A. y cols.* Perfil de citocinas en hepatitis C crónica de acuerdo con el grado de fibrosis, en la búsqueda de nuevos biomarcadores
 - 210 *Gómez-Mendoza R. A. y cols.* Correlación de dos equipos de elastografía transitoria para estimación de esteatosis y fibrosis hepática
 - 210 *Hidalgo-Muñoz S. y cols.* Prevalencia de infección por virus de hepatitis C en intoxicación por opioides en una ciudad fronteriza
 - 211 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Seroprevalencia de virus de hepatitis B y C en donadores de sangre en un hospital de tercer nivel del 2019 al 2023
 - 212 *Leija-Walle R. y cols.* Hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y su relación con otras enfermedades autoinmunes: estudio de cohorte
 - 213 *Rivera-Medina I. L. y cols.* Experiencia de un hospital de tercer nivel en el tratamiento de la hepatitis autoinmune con tacrolimus como tratamiento de segunda línea
 - 213 *Gutiérrez-Rodríguez E. A. y cols.* Cociente RDW/plaquetas como marcador indirecto de fibrosis hepática significativa en pacientes con enfermedad hepática autoinmune en la UMAE No. 25, IMSS
 - 214 *Ortega-Tecuatl J. A. y cols.* Respuesta a bezafibrato (BZF) en pacientes con colangitis biliar primaria (CBP) no respondedores a ácido ursodesoxicólico (UDCA)
 - 215 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Índice neutrófilo/linfocito como predictor pronóstico en pacientes con colangitis biliar primaria
 - 216 *Govea-Mendoza B. y cols.* Respuesta clínica a bezafibrato en pacientes con colangitis biliar primaria refractarios al tratamiento con ácido ursodesoxicólico en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE
 - 216 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Características del síndrome de sobreposición en pacientes mexicanos
 - 216 *Guirao-Pérez R. y cols.* Asociación entre síndrome metabólico y respuesta a tratamiento con ácido ursodesoxicólico en colangitis biliar primaria
 - 217 *Ponce-Tejeda A. y cols.* Síndrome de superposición hepatitis autoinmune y lupus eritematoso sistémico: serie de casos
 - 217 *Caloca-Camarena F. y cols.* Efecto terapéutico preventivo de la N-acetilcisteína mediante la regulación de la vía antioxidante de Nrf2 en el hepatocarcinoma experimental
 - 217 *Tadeo-Espinoza H. N. y cols.* Factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular en pacientes con enfermedad hepática autoinmune
 - 219 *Priego-Parra B. A. y cols.* Evaluación del rendimiento diagnóstico de dieciséis biomarcadores para el diagnóstico de MASLD
 - 220 *Pérez-Castañeda A. G. y cols.* TSH y su correlación con el desarrollo de fibrosis hepática en pacientes con hipotiroidismo en hospital de tercer nivel de atención
 - 221 *González-Gómez K. D. y cols.* Evaluación de sarcopenia y fragilidad, entidades clínicas que impactan la calidad vida en MASLD
 - 221 *Díaz-Canul C. y cols.* Beneficios de la suplementación con donadores de grupo metilo en el eje intestino-hígado en un modelo de MetALD
 - 221 *Chi-Cervera L. A. y cols.* Las pequeñas y densas partículas de colesterol LDL son un marcador útil de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes con esteatosis hepática metabólica
 - 222 *Prieto-Nava J. D. y cols.* Prevalencia de esteatosis y fibrosis hepática avanzada asociada a MASLD en pacientes que viven con infección por VIH evaluada por VCTE
 - 223 *Hernández-Santillán M. y cols.* Evaluación de IGFBPS séricas en hepatopatías crónicas como biomarcadores
 - 223 *Herrera-Martínez H. M. y cols.* Factores clínicos relacionados al desarrollo de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) en pacientes con hepatitis autoinmune
 - 224 *Fernández-Garibay V. M. y cols.* Quantose-IR: ¿una nueva herramienta en el estudio de esteatosis hepática?

- 224 Alfaro-Martínez C. R. y cols. La manga gástrica disminuye el grado de esteatosis en pacientes con obesidad/MASLD
- 225 Silva-Tinoco R. y cols. Análisis de los cambios en el índice FIB-4 en adultos con diabetes tipo 2 en un programa efectivo de atención integral de la diabetes
- 225 Cornejo-Hernández S. y cols. Niveles de hemoglobina glicosilada como predictor de fibrosis hepática por MASLD
- 227 Mejía-Ramírez J. y cols. Experiencia en el tratamiento de quistes hepáticos simples en un hospital de tercer nivel
- 228 Cornejo-Gutiérrez M. A. y cols. Factores asociados a respuesta completa en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a quimioembolización transarterial en el noreste de México
- 228 Hernández-Garza V. y cols. La utilidad del índice pronóstico nutricional como factor pronóstico en la supervivencia de los pacientes con carcinoma hepatocelular
- 229 Sánchez-Salinas F. y cols. Predictores de respuesta en pacientes con carcinoma hepatocelular tratados con quimioembolización transarterial convencional
- 229 Tórrez-Arias L. A. y cols. Enfermedad poliquística hepática en un hospital de tercer nivel
- 230 Arceo-Orozco S. y cols. Pirfenidona aumenta la inmunovigilancia tumoral en un modelo de hepatocarcinoma experimental, restringiendo la inducción de células T reguladoras a través de la vía canónica de TGF- β
- 232 Esesarte-Rodríguez M. y cols. Eructos supragástricos: caracterización epidemiológica, clínica y su asociación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 233 Hurtado-Díaz de León I. y cols. Evaluación de la asociación entre el índice de masa corporal y el tiempo de exposición al ácido en pacientes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
- 233 Ordóñez-Vázquez A. L. y cols. Factores relacionados al paciente que incrementan el tiempo de adquisición de la manometría esofágica de alta resolución: un estudio transversal
- 234 Jiménez-Castillo R. A. y cols. Estudio comparativo entre el valor de la integral contráctil de la unión esofagogástrica en sedestación frente a la medición en decúbito supino como predictor de ERGE
- 234 Coutiño-Flores M. y cols. Integral contráctil distal de la unión esofagogástrica contra el tipo de válvula, unión y tonicidad gastroesofágica. ¿Cuál es el mejor predictor para enfermedad por reflujo gastroesofágico?
- 235 Félix-Téllez F. A. y cols. Hipertonía del esfínter esofágico superior como potencial marcador objetivo en globus funcional
- 235 Soto-Villalpando M. y cols. Síntomas recurrentes en pacientes postfunduplicatura: hallazgos manométricos mediante el nuevo Consenso de Padova
- 236 Schmulson M. y cols. Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico con fexuprazán: resultados de un consenso Delphi
- 236 Félix-Téllez F. A. y cols. Prevalencia y utilidad de criterios de apoyo en la clasificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico según Lyon 2.0 en pacientes mexicanos
- 237 García-Zermeño K. R. Caracterización del rendimiento diagnóstico de los síntomas percibidos en la diferenciación de eructos supragástricos con y sin ERGE
- 237 Orozco-Gámiz A. y cols. Lapso de tiempo entre la cena y el momento de acostarse a dormir, importancia en pacientes con enfermedad por reflujo, cohorte retrospectiva de 500 casos al azar
- 238 García-Zermeño K. R. y cols. Rendimiento diagnóstico del número de síntomas reportado por los pacientes durante la pH-impedancia intraluminal en el espectro de los trastornos relacionados con los eructos y la ERGE
- 238 Guerrero-Barrera R. C. y cols. Utilidad diagnóstica de la impedancia media basal nocturna y factores asociados a su variación
- 239 Rodríguez-Jacobo S. y cols. Asociación de alteraciones motoras esofágicas en pacientes con reflujo gastroesofágico diagnosticado por pH-metría e impedancia
- 240 Rodríguez-Jacobo S. y cols. Ingesta de cáusticos en adultos: características clínicas y hallazgos endoscópicos en un centro de referencia del noreste de México
- 240 Romero-Osuna K. M. y cols. Diferencia en la respuesta terapéutica a tratamiento quirúrgico en pacientes con acalasia tipo II con presiones focales elevadas vs. sin presiones focales elevadas
- 240 Vera-Nungaray S. A. y cols. Relación entre el síntoma inicial y el tiempo de diagnóstico en pacientes

- de un hospital de tercer nivel en el centro de México con acalasia
- 241 Arenas-Martínez J. S. y cols. Descripción de la respuesta contráctil del esfínter anal posterior al reflejo rectoanal inhibitorio en sujetos con estreñimiento
 - 242 Gallardo-González L. I. y cols. Eficacia y efectos adversos del tratamiento escalonado en el estreñimiento funcional
 - 242 Ávila-Franco A. Y. y cols. Escala EAT-10 como herramienta para el cribado de disfagia esofágica en pacientes adultos del Hospital Juárez de México
 - 242 Félix-Téllez F. A. y cols. Diferencias clínicas entre la clasificación de acalasia según Chicago 4.0 y los subtipos de acalasia tipo II con presión focal o presurización panesofágica de 70 mmHg
 - 243 Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols. Características clínicas y endoscópicas de la hemorragia de tubo digestivo masiva
 - 244 Aldana-Ledesma J. M. y cols. Comparación entre distintas escalas para predecir mortalidad en pacientes con ERC terminal y hemorragia digestiva alta
 - 244 Espinoza-Villalobos I. D. y cols. Calidad de vida en pacientes con dispepsia funcional en tratamiento con neuromodulador en un hospital de tercer nivel en la ciudad de Puebla
 - 245 Sánchez-Araiza A. y cols. Caracterización clínica, endoscópica y tasa de detección de displasia en pacientes con esófago de Barrett
 - 245 Fuentes-Montalvo A. y cols. Desempeño de pacientes con disinergia defecatoria utilizando un test de apraxia ideomotora modificado
 - 246 Bolio-Lavalle L. y cols. Detección y diferenciación de patrones motores anorrectales por manometría anorrectal de alta resolución en pacientes referidos al servicio de neurogastroenterología y motilidad por estreñimiento, incontinencia fecal o dolor anal
 - 246 Castro-Zárate A. L. y cols. Comparación del tránsito y la retención del bolo entre pacientes con motilidad esofágica inefectiva y motilidad esofágica normal mediante manometría de alta resolución con impedancia
 - 247 Medina-Morales K. E. y cols. El síndrome de intestino irritable subtipo diarrea se asocia a menor resiliencia y mayor severidad de síntomas
 - 247 Céspedes-Saballos Y. G. y cols. Frecuencia de los trastornos digestivos funcionales en pacientes con fibromialgia en un hospital de tercer nivel
 - 248 Carrillo-Rojas J. I. y cols. Validación del *Cough reflux index*: una novedosa herramienta para predecir enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes con síntomas laringofaríngeos crónicos
 - 248 Velasco-Santiago Y. M. y cols. Impacto del síndrome de intestino irritable en la productividad laboral y actividades cotidianas de pacientes mexicanos
 - 249 Schmulson M. y cols. Participación de la enzima nicotidamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa en síndrome de intestino irritable (SII)
 - 249 Medina-Morales K. E. y cols. Prevalencia de manifestaciones extraintestinales según el subtipo de síndrome de intestino irritable
 - 250 Ordóñez-Vázquez A. L. y cols. Impacto de la terapia de biorretroalimentación en pacientes con incontinencia fecal