

Imágenes Clínicas en Gastroenterología


Diverticulosis Adquirida del Apéndice Cecal




(a)



(b)



(c)



(d)

Hombre de 47 años de edad que inició su padecimiento un día antes con dolor en fosa iliaca derecha, fiebre, náuseas, signos de irritación peritoneal y leucocitosis con neutrofilia. La radiografía simple de abdomen mostró íleo segmentario en la fosa iliaca derecha (A). Fue sometido a laparotomía exploradora y se extirpó apéndice vermiforme retrocecal. La superficie externa del apéndice presentó un plastrón con membranas purulentas; al corte se observaron varios divertículos adquiridos rodeados por tejido adiposo (B). El estudio histológico reveló herniaciones de la mucosa al través de interrupciones de la musculatura propia (C); en algunos divertículos se apreció inflamación aguda purulenta (D).

Dr. Ernesto Ramos-Martínez *, Dr. Gerardo Téllez-Cienfuegos †, Dra. María Cecilia Ishida-Gutiérrez *

* Servicios de Anatomía Patológica e, † Imagenología, Hospital Central Universitario, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chih.

Dr. Ernesto Ramos-Martínez, Calle Gómez Farias 115, Sector Centro, Chihuahua, Chih. CP31000, Teléfono y Fax: (14) 16-51-99.

Recibido para publicación: 21/VII/95. Aceptado para publicación: 4/IX/95.