

Imágenes clínicas en gastroenterología

Pólipo adenomatoso del apéndice cecal



Figura 1.




Figura 2.



Figura 3.

Hombre de 39 años de edad que inició su padecimiento 3 días antes con dolor en epigastrio y fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas, vómitos e hipertermia. Ingresó al Hospital General del Centro Médico Nacional y en la exploración física se encontraron datos de abdomen agudo. La biometría hemática exhibió leucocitosis con desviación a la izquierda. Se efectuó apendicectomía. El espécimen quirúrgico mostró apendicitis aguda (no ilustrada) y como hallazgo una neoformación polipoide localizada en el tercio distal, muy cercana a la punta, aterciopelada, semifirme y de 1 cm de diámetro (*Figura 1*). En los cortes histológicos se encontró una neoplasia epitelial benigna, con un pedículo corto, que dilatava la luz y producía atrofia de la mucosa sana (*Figura 2*). A mayor aumento la neoplasia presentaba estructuras tubulares revestidas por epitelio columnar, con disminución de células caliciformes, estratificación nuclear e incremento de mitosis (*Figura 3*).

Dr. Ernesto Ramos-Martínez*

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Central Universitario, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Correspondencia: Dr. Ernesto Ramos-Martínez, Calle Gómez Farías 115, Sector Centro, Chihuahua, Chih. Tel. (14) 16-51-99