

Imágenes clínicas en gastroenterología

Fito-tricobezoar



Figura 1.



Figura 2.



Figura 3.

Mujer de 19 años de edad, originaria de Chiapas, radica en Chetumal, Edo. de Q. Roo, dedicada al hogar y con escolaridad hasta el 5° año de primaria. Padecimiento actual de aproximadamente 1 año de evolución con anorexia, pérdida de 8 kilogramos de peso, dolor en epigastrio de leve a moderado. Súbitamente un mes antes de su ingreso presenta dolor en epigastrio acompañado de náuseas y vómitos. Exploración física: adelgazada, palidez, aumento de volumen en epigastrio aproximadamente de 6 por 5 cm, dura, lisa, no móvil.

Serie gastroduodenal. Defecto de llenado en cuerpo gástrico.

Endoscopia. Masa ocupativa por cabellos en casi 90%.

Procedimiento quirúrgico. Gastrostomía en cara anterior con extracción de masa ocupativa.

Masa ocupativa. Contenido mixto de cabellos y fibra en estómago y primera y segunda porción del duodeno.

Diagnóstico. Fito-tricobezoar.

Dr. Gilberto García Hernández,* Dr. Menandro Priego Sabido,** Dr. Daniel Portales Barrera**

* Cirujano general. Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1. Instituto Mexicano del Seguro Social. Chetumal, Q. Roo

** Colaboradores.

Correspondencia: Adolfo López Mateos y Nápoles, Colonia Campestre, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77000